

# Normas de Vacunación Antigripal Argentina 2011 (MSAL)

# CAMPAÑA DE INVIERNO

## CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL

### POBLACION OBJETIVO Y DEFINICION DE ACCIONES

POBLACIÓN	ACCIONES
Trabajadores de la Salud	Aplicar una dosis de 0.5 ml de <b>vacuna antigripal trivalente FLUVIRIN®</b> (excepto trabajadoras de salud embarazadas)
Embarazadas	Aplicar una dosis de 0.5 ml con <b>Vacuna Agrippal®</b> adultos en cualquier momento de la gestación.
Puérperas hasta los 6 meses posparto	Aplicar una dosis de 0.5 ml de Vacuna antigripal trivalente ( <b>Agrippal® adultos</b> ), si no hubieran recibido vacuna en embarazo

# CAMPAÑA DE INVIERNO

## CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRI PAL

### POBLACION OBJETIVO Y DEFINICION DE ACCIONES II

POBLACIÓN	ACCIONES
Niños y niñas de 6 meses a 24 meses inclusive.	<p>Aplicar dos dosis de 0.25 ml de vacuna antigripal trivalente (<b>Vacuna Agrippal® Pediátrica</b>) separadas por, al menos, 4 semanas, independientemente de los factores de riesgo.</p> <p>Los menores de 24 meses que hubieran recibido 2 dosis de vacuna antigripal trivalente en cualquier momento de su vida, deben recibir solo 1 dosis.</p>
Niños y niñas de 24 meses a 35 meses con condiciones especiales del sector publico	<p>Aplicar dos dosis de 0.25 ml de vacuna trivalente (<b>Vacuna Agrippal® Pediátrica</b>) separadas por al menos 4 semanas.</p> <p>Los menores de 35 meses que hubieran recibido 2 dosis de vacuna antigripal trivalente en cualquier momento de su vida, deben recibir solo 1 dosis.</p> <p>**Los niños vacunados por primera vez en su vida, con vacuna antigripal monovalente (1 o 2 dosis), en la Campaña de Vacunación Pandémica 2010, deben recibir 2 dosis.</p>



# CAMPAÑA DE INVIERNO

## CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL

### POBLACION OBJETIVO Y DEFINICION DE ACCIONES III

POBLACIÓN	ACCIONES
Niños y niñas de 35 meses a 9 años con condiciones especiales del sector publico*	<p>Dos dosis de 0.5 ml de <b>Vacuna Agrippal®</b> separadas por al menos 4 semanas.</p> <p>Los menores de 9 años que hubieran recibido 2 dosis de vacuna antigripal trivalente en cualquier momento de su vida, deben recibir solo 1 dosis.</p> <p>Los niños vacunados por primera vez en su vida, con vacuna antigripal monovalente (1 o 2 dosis), en la Campaña de Vacunación <i>Pandemica</i> 2010, deben recibir 2 dosis.</p>
Niños y adultos de 9 años a 65 años con condiciones especiales* del sector público	Se aplicará una dosis de 0.5 ml de vacuna antigripal trivalente, <b>Vacuna Agrippal®</b>
Adultos mayores de 65 años de edad del sector público	Se aplicará una dosis de 0.5 ml de vacuna trivalente <b>Vacuna adyuvantada FLUAD®</b>

# CAMPAÑA DE INVIERNO

## CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL

### POBLACION OBJETIVO

1. Trabajadores de salud: (**Vacuna FLUVIRIN®**)  
Excepto trabajadoras de salud embarazadas.
2. Embarazadas y Púerperas: (**Vacuna Agrippal® adultos**)  
Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación.  
Púerperas hasta los 6 meses luego del parto.
3. Niños de 6 meses a 24 meses (inclusive) (**Vacuna Agrippal®  
Pediátrica**)  
Independientemente de los factores de riesgo.



## POBLACION OBJETIVO II

4. Niños y adultos de 2 años a 64 años del sector público (**Vacuna Agrippal®**)
  1. Obesos mórbidos
  2. Retraso madurativo severo.
  3. Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas severas.
  4. **Enfermedad respiratoria crónica** (Hemia Diafragmática, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfisema Congénito, Displasia Broncopulmonar, Enfisema, Pacientes traqueostomizados crónicos, Pacientes con Bronquiectasias, Fibrosis Quística , etc)
  5. Asma
  6. Cardiopatías congénitas
  7. Trasplantados
  8. Enfermedad Oncohematológicos
  9. Insuficiencia Renal Crónica
  10. Inmunodeficiencia congénita o adquirida.
  11. Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis
  12. Diabéticos.
  13. Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o reemplazo valvular o valvulopatía.
  14. Tratamiento crónico con ácido acetil salicílico en menores de 18 años
  15. Asplenia funcional o anatómica
  16. Desnutricion severa
  17. Convivientes de enfermos oncohematológicos y contactos estrechos de niños menores de 6 meses.
5. Pacientes mayores de 65 años del sector publico (**Vacuna adyuvantada FLUAD®**)